

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

VICTOR GEL

Registrazione del Ministero della Salute n. 19376

GEL INSETTICIDA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARAFAGGI



Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Imidacloprid puro 2,15 g (24,5 g/l)
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100 g

Caratteristiche

VICTOR GEL è un insetticida pronto all'uso efficace contro le blatte (ninfe ed adulti) delle specie *Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa* e *Periplaneta americana*.

Si applica con una pistola dosatrice di precisione e, grazie alla sua appetibilità ed al suo potere attrattivo, offre la massima efficacia nel controllo degli scarafaggi.

Il prodotto può essere utilizzato per la disinfestazione di abitazioni, cinema, scuole, ospedali, caserme, bar, ristoranti, alberghi, campeggi, treni, navi, aerei, magazzini, industrie in genere, industrie e laboratori alimentari.

Modalità di impiego

Prima dell'applicazione effettuare un'accurata ispezione per verificare lo stato dell'infestazione ed individuare i principali siti in cui sono presenti gli scarafaggi.

Effettuare trattamenti localizzati mediante la pistola dosatrice, nei siti frequentati dagli scarafaggi, luoghi di passaggio, luoghi caldi ed umidi (in vicinanza dei lavandini, delle condotte idriche, dietro i motori delle apparecchiature elettriche quali frigoriferi, computer, registratori, centraline elettriche), dietro cucine, mobili, forni, luoghi di accumulo rifiuti e laddove sia prevedibile l'annidamento degli scarafaggi.

Dosi d'impiego

Applicare gocce di prodotto della grandezza di una lenticchia, circa 4 mm pari a 0,04 grammi.

- Contro *Blattella germanica* e *Supella longipalpa*: applicare, a seconda del grado di infestazione, 1-4 gocce da 0,04 grammi per metro quadrato
- Contro *Blatta orientalis* e *Periplaneta americana*: applicare, a seconda del grado di infestazione, 2-6 gocce da 0,04 grammi per metro quadrato.

Se viene utilizzato il contenitore di protezione del gel posizionarlo nelle vicinanze delle tane e/o lungo i percorsi usuali degli scarafaggi una volta individuati. Qualora si debbano controllare forti infestazioni all'esterno delle abitazioni, sarà necessario distribuire numerosi contenitori, distanziandoli di circa due metri l'uno dall'altro. Gli scarafaggi muoiono nelle ore successive all'ingestione del gel. Poiché gli scarafaggi hanno come abitudine alimentare quella di passarsi gli alimenti, di nutrirsi dei cadaveri e degli escrementi appartenenti alla propria specie, in questo modo trasmettono l'insetticida all'interno della popolazione creando un effetto a catena che prolunga l'attività del prodotto. In condizioni normali VICTOR GEL ha una durata d'azione di circa 3 mesi. In presenza di forti infestazioni è consigliabile ripetere il trattamento dopo 1-2 settimane.

Confezione: cartuccia da 35 grammi in scatola da 12 pezzi
cartuccia da 35 grammi in scatola da 4 pezzi

COD 1-6-35

COD 1-6-35-4